



Cara Mengatasi KIPi

Apabila tubuh mengalami reaksi setelah vaksinasi:

TETAP TENANG

- Jika terjadi reaksi seperti nyeri, bengkak atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin pada lokasi tersebut.
- Jika terjadi demam, kompres dengan air hangat/mandi dengan air hangat, perbanyak minum air putih dan istirahat.
- Jika dibutuhkan, minum obat sesuai anjuran petugas kesehatan.

Segera hubungi petugas kesehatan jika gejala berlangsung lebih dari tiga hari atau jika terjadi reaksi yang lebih berat.

BERSABAR

Tubuh perlu waktu untuk membangun kekebalan. Seseorang baru dapat dikatakan divaksinasi, setidaknya 2 minggu setelah dosis lengkap.

Jaga diri dan orang lain. Vaksin-vaksin yang tersedia menunjukkan efektivitas tinggi dalam melindungi penerimanya dari kejadian sakit berat akibat COVID-19. Akan tetapi, orang yang sudah divaksin masih mungkin menularkan COVID-19, meskipun tanpa gejala. Sebab itulah, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan demi diri sendiri dan orang lain, hindari kerumunan, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan selalu kenakan masker di luar rumah.



Cara Mengatasi KIPi

Apabila tubuh mengalami reaksi setelah vaksinasi:

TETAP TENANG

- Jika terjadi reaksi seperti nyeri, bengkak atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin pada lokasi tersebut.
- Jika terjadi demam, kompres dengan air hangat/mandi dengan air hangat, perbanyak minum air putih dan istirahat.
- Jika dibutuhkan, minum obat sesuai anjuran petugas kesehatan.

Segera hubungi petugas kesehatan jika gejala berlangsung lebih dari tiga hari atau jika terjadi reaksi yang lebih berat.

BERSABAR

Tubuh perlu waktu untuk membangun kekebalan. Seseorang baru dapat dikatakan divaksinasi, setidaknya 2 minggu setelah dosis lengkap.

Jaga diri dan orang lain. Vaksin-vaksin yang tersedia menunjukkan efektivitas tinggi dalam melindungi penerimanya dari kejadian sakit berat akibat COVID-19. Akan tetapi, orang yang sudah divaksin masih mungkin menularkan COVID-19, meskipun tanpa gejala. Sebab itulah, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan demi diri sendiri dan orang lain, hindari kerumunan, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan selalu kenakan masker di luar rumah.

Jangan Takut Vaksin Covid-19

Vaksin adalah zat yang dapat memicu terbentuknya kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Vaksin yang terdiri dari banyak jenis dan kandungan yang berguna dalam melawan penyakit berbahaya. Pada vaksin Covid-19 mengandung virus yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan sehingga vaksin aman dengan dosis dan penggunaan yang tepat.

Selain itu yang harus diperhatikan adalah kondisi seseorang sebelum dilakukan vaksinasi. Petugas akan memastikan dulu bahwa kondisi tubuh calon penerima vaksin saat itu dalam keadaan baik dan sehat. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan KIPI.

Mengapa Bisa Terjadi KIPI?

KIPI adalah salah satu reaksi tubuh pasien yang tidak diinginkan yang muncul setelah pemberian vaksin. KIPI dapat terjadi dengan tanda atau kondisi yang berbeda-beda. Meski demikian jangan khawatir kejadian KIPI cenderung ringan dan dapat membaik dengan sendirinya.

Beberapa bentuk KIPI ringan hingga sedang yang mungkin dialami pasca vaksinasi adalah:

- Rasa pegal di sekitar area suntik
- Demam ringan
- Rasa lelah
- Sakit kepala
- Pegal pada otot atau sendi
- Menggigil
- Diare



Jangan Takut Vaksin Covid-19

Vaksin adalah zat yang dapat memicu terbentuknya kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Vaksin yang terdiri dari banyak jenis dan kandungan yang berguna dalam melawan penyakit berbahaya. Pada vaksin Covid-19 mengandung virus yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan sehingga vaksin aman dengan dosis dan penggunaan yang tepat.

Selain itu yang harus diperhatikan adalah kondisi seseorang sebelum dilakukan vaksinasi. Petugas akan memastikan dulu bahwa kondisi tubuh calon penerima vaksin saat itu dalam keadaan baik dan sehat. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan KIPI.

Mengapa Bisa Terjadi KIPI?

KIPI adalah salah satu reaksi tubuh pasien yang tidak diinginkan yang muncul setelah pemberian vaksin. KIPI dapat terjadi dengan tanda atau kondisi yang berbeda-beda. Meski demikian jangan khawatir kejadian KIPI cenderung ringan dan dapat membaik dengan sendirinya.

Beberapa bentuk KIPI ringan hingga sedang yang mungkin dialami pasca vaksinasi adalah:

- Rasa pegal di sekitar area suntik
- Demam ringan
- Rasa lelah
- Sakit kepala
- Pegal pada otot atau sendi
- Menggigil
- Diare

